

LAMPYRIDES et DRILIDE

nouveaux de la collection de M. VETH.

DÉCRITS PAR

ERNEST OLIVIER,

membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de
Londres, correspondant du Museum d'Histoire
naturelle de Paris, etc.

Lampyridæ.

Lucernuta (Pyrocelia) fuscescens nov. sp. — Elongata, oblonga, nigra, elytris compressis, dentatis; prothorace rufo, antice rotundato, crebre punctato, disco laevi, plagis lucidis minutis, margine antico erecto, basi recte truncato et punctis profundis marginato; scutello rufo, conico; elytris prothoracelatoribus, ampliatis, apicem versus simul rotundatis, crebre et profunde punctatis, obsolete costulatis, rufis, in medio longitudinaliter infuscatis; pygidio trilobato, duobus penultimis ventris segmentis plaga transversa lucida ornatis, ultimo postice rotundato. — Long. 15—17 mill.

Java: Preanger (P. F. Sijthoff).

Corps tout noir, à l'exception de deux taches transversales au milieu des 5^{ème} et 6^{ème} segments du ventre. Prothorax roux avec une tache discoidale légèrement orangée, arrondi en avant, grossièrement ponctué sur les marges, presque lisse sur

le disque, à base bordée d'une rangée de gros points enfoncés, angles obtus; écusson roux, conique; élytres allongés, plus larges à la base que le prothorax, s'élargissant encore, puis s'atténuant et s'arrondissant à l'angle apical, grossièrement poutués, d'un roux flave avec une bande brune longitudinale plus rapprochée de la suture que du bord externe et n'atteignant ni la base, ni le sommet. Cette bande peut prendre une plus ou moins grande extension: dans les exemplaires que j'ai vus, elle ne touche ni la base, ni le sommet et dans quelques uns, elle ne dépasse pas la moitié basilaire de l'élytre.

Cette espèce a la forme allongée et la coloration de *L. plagiata* Gorh.; mais le prothorax est plus court, mieux arrondi antérieurement, les côtes des élytres sont à peine saillantes, la tache noire des élytres qui part près de leur base n'atteint pas l'angle apical.

Pteroptyx decolor nov. sp. — Oblongus, angustus, pubescens, pallide testaceus, oculis, antennis, tarsisque fuscis; prothorace subquadrato, basi recte truncato, in medio antico anguloso, angulis posticis et anticis rectis; ♂ ultimo ventrali segmento trilobato, elytris apice plicatis; ♀ prothorace antice minus anguloso, ultimo ventrali segmento triangulari, elytris haud plicatis. — Long. 6—7 millim.

Atjeh ♂; Borneo ♀ (Ma coll.)

En entier d'un testacé blanchâtre à l'exception des yeux, des antennes et des tarses qui sont bruns. Voisin de *P. Malaccæ* Gorh., mais bien différent par la couleur testacée de sa tête et ses élytres concolores sans tache apicale noire.

Ototreta lusoria nov. sp. — Oblonga, capite, palpis, antennarum duobus primis articulis, prothorace, scutello, pectore et femoribus testaceis; prothorace brevi, transverso, senilunari, nitido, lævi, tenuiter sulcatulo, margine antico vix erecto, angulis sat retro productis; elytris nigris, prothorace latioribus, oblongis, rugosis; ventre piceo, quarto segmento lucido, tibiis et tarsis obscuris — Long. 5 mill.

Sumatra : Manna (M. Knappert).

Différent de *O. fornicata* Ern. Oliv. par sa taille moindre, la marge de son prothorax très légèrement redressée, la coloration des antennes, de la tête et des jambes; de *O. subtilis* Ern. Oliv. par son écusson testacé, son prothorax lisse et bien en forme de demilune, la coloration de sa tête, de sa poitrine et des premiers articles des antennes.

Ototreta plumigera nov. sp. — Oblonga, capite testaceo, inter antennas picea; palpis piceis, ultimo articulo testaceo; antennis nigris, articulis 3—10 flabellatis, 11^o simplice larceolato; prothorace testaceo, brevi, semilunari, nitido, laevi, sulcato, margine antico erecto, angulis sat prominulis; scutello testaceo, triangulari, apice truncato; elytris prothorace vix latioribus, oblongis, rugosis, costulatis, nigris, macula humerali testacea, pectore testaceo, ventre nigro, pedibus piceis. — Long. 7,5 mill.

Sumatra : Manna (M. Knappert).

Le front, la bouche, le dernier article des palpes, le prothorax, l'écusson, la poitrine et une tache humérale aux élytres sont d'un roux testacé. Espèce remarquable dans le genre par la conformation des antennes dont les articles 3 à 10 sont munis d'une lamelle lanceolée, élargie, prenant naissance au sommet de l'article et plus longue que l'article lui même.

Luciola laticollis Gorh. — La tache noire du prothorax qui occupe, chez le type, le disque entier est réduite sur un exemplaire ♀ provenant de Sumatra à une macule attenant au bord antérieur et n'atteignant par la base. Deux exemplaires ♂ de ma collection provenant de Cochinchine offrent la même conformation.

Photuris fausta nov. sp. — Oblonga, pubescens, pallide flavescens; mandibulis et tarsorum unguiculis piceis; antenarum articulis 3—11 fuscis, circa basim flavo tenuiter annulatis; prothorace subogivali, punctato, basi sinuato, angulis obtusis, pallide flavo, disco roseo-maculato; scutello triangulari, flavido; elytris villosis, rugosulis, pallide flavis; tribus ultimis

ventris segmentis lucidis; externis tarsorum unguiculis in utroque sexu fassis; ♂ 5^o et 6^o ventris segmentis in medio postico emarginatis, ultimo breviter mucronato. — Long. 12—15 mill.

Guyane : Paramaribo.

Entièrement d'un jaunâtre pâle, sauf la majeure partie des articles 3—11 des antennes qui est brune, les mandibules et les ongles des tarses brun de poix et une tache rose tendre sur le disque du prothorax. Ce dernier est atténué en avant en forme d'ogive largement arrondie. Tout le corps est couvert d'une pubescence flave assez dense.

La couleur uniformément pâle des élytres et la tache rose tendre du prothorax différencient bien cette espèce de ses voisines.

Drilidæ.

Phrixothrix pygmæus nov. sp. — Flavescens, setis hirsutis undique vestitus; oculis nigris, capite plano; antennis prothorace haud longioribus, articulo primo elongato, crasso, secundo transverso brevi, sequentibus biflabellatis, flabellis e basi nascentibus, ultimo lanceolato ceteris longiore; prothorace subquadrato, antice rotundato, basi sinuato, angulis posticis, rectis, margine punctato, disco lævi utrinque foveolato; scutello piceo-flavo, conico, apice truncato; elytris prothorace paulo latioribus, elongatis, attenuatis, abbreviatis, tertio abdominis segmento vix longioribus, fuscis, nitidis, basi piceis, postice rugosis, margine et sutura circa apicem incrassatis; alis longis, nigris. — Long. 5 mill.

Java : Banjoewangi (Mac Gillavry).

Entièrement flave, sauf les yeux, les élytres et les ailes qui sont d'un noir brunnâtre; tout couvert de longues soies hérissées qui prennent la coloration des téguments sur lesquels elles se trouvent. Antennes pas plus longues que le prothorax,

articles 3 à 10 munis chacun de deux lamelles filiformes prenant naissance de chaque côté à leur base ou elles occasionnent un renflement; ces lamelles sont aigues, ciliées et plus longues que l'article correspondant; le 11^e article est également bilamellé mais est beaucoup plus long que ses lamelles et que les précédents articles. Elytres atténués en arrière, courts et ne dépassant guère le troisième segment abdominal, chargés d'une ponctuation qui devient rugueuse et presque tuberculeuse à l'angle apical où on voit les traces d'une côte saillante longitudinale; marge externe et suture épaissies en bourrelet autour de cet angle. Ailes noires plus longues que l'abdomen.

Le genre *Phrixothrix* que j'ai établi en 1909 (Bull. Soc. Ent. France p. 344) est remarquable dans la famille des Drilidæ par la conformation de ses antennes biflabellées. Ce genre comprend à ce jour cinq espèces: *pallens* Berg et *uruguayensis* Berg de l'Uruguay, *hirtus* Ern. Oliv. et *Heydeni* Ern. Oliv. de Paraguay et *pygmaeus* Ern. Oliv. de Java.
